

Trigonométrie

(Syllabus Chapitre VI)

Contenu de la section

Trigonométrie

La trigonométrie c'est l'étude des triangles. Plus spécifiquement, l'étude des liens entre

- ▶ la mesure des angles, et
- ▶ la mesure des côtés dans un triangle.

Plus généralement, la trigonométrie devient l'étude des angles.

Question

Comment mesurer des angles ?

Contenu de la section

Trigonométrie


La notion d'angle : généralités

Le radian

Intuitivement, un angle est une fraction de “faire un tour complet”.
Pour le mesurer on utilisera généralement:

- ▶ le degré (1 tour = 360 degrés), ou
- ▶ le radian (1 tour = 2π radians)

Le radian sera notre choix. Mathématiquement parlant, c'est le plus efficace car ça ne nécessite pas de manipuler de gros multiples.



Faire un demi tour dans un sens ou dans l'autre n'est pas pareil.

$\Rightarrow$ on parle d'angle orienté lorsque cela est important !

Dans le plan :

Orientation positive Sens *trigonométrique* anti-horaire

Orientation négative Sens horaire

Contenu de la section


Trigonométrie

La notion d'angle : généralités

Le radian

Pourquoi 2π ?

Un *radian* (1 rad) correspond à l'angle au centre d'un cercle qui intercepte, sur la circonférence, un arc dont la longueur est égale au rayon du cercle.



Plus généralement, un angle de $\alpha \text{ rad}$ au centre intercepte sur la circonférence un arc de longueur $r\alpha$. Pour cette raison le radian est idéal pour calculer et manipuler des longueurs d'arcs !

Pour passer du radian au degré et inversement, retenons que

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ.$$

Par habitude, nous retiendrons également le tableau suivant :

en radians	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	π	2π
en degrés	30°	45°	60°	90°	180°	360°

$$\frac{360^\circ}{12}$$

Contenu de la section

Fonctions trigonométriques

Contenu de la section

Fonctions trigonométriques


- Définitions de sinus, cosinus, ...

- Pente et angle

- Relation fondamentale

- Symétries

- Fonctions périodiques



Cercle de
rayon 1
centre en
(0,0)


Définition

Soit un angle θ en radians. Soit P le point du cercle de centre 0 et de rayon 1 qui fait un angle θ avec l'horizontale. Alors


- ▶ $\cos \theta$ est l'abscisse du point P , et
- ▶ $\sin \theta$ est l'ordonnée du point P .

Définition

Un *cercle trigonométrique* est un cercle de rayon 1. Il permet de représenter géométriquement toutes les fonctions trigonométriques.



Attention: faire un tour et demi sur le cercle (3π) correspond à la même position finale que faire un demi tour (π). On parlera donc souvent de mesure des angles "à 2π près". (à 1 ou plusieurs tours près complètes)



Dans ce cercle, $\sin(\theta)$ et $\cos(\theta)$ gardent leur interprétation classique: $\sin$ est "côté opposé sur hypoténuse", etc...

Autres fonctions trigonométriques importantes :

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

$$\cot(\theta) = \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)}$$

Contenu de la section

Fonctions trigonométriques

Définitions de sinus, cosinus, ...

Pente et angle

Relation fondamentale

Symétries

Fonctions périodiques

Pente et angle


Résultat

Soit un repère cartésien *orthonormé*. Pour une droite d'équation $y = mx + p$ formant un angle (orienté) θ avec l'horizontale, nous avons

$$m = \tan \theta$$


$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

où (x_0, y_0) et (x_1, y_1) sont deux points distincts du graphe de f .



Remarque

Cette interprétation ne tient plus si les axes ne sont pas gradués à l'identique :



Contenu de la section

Fonctions trigonométriques

Définitions de sinus, cosinus, ...


Pente et angle

Relation fondamentale

Symétries

Fonctions périodiques

Relation fondamentale entre cos et sin



On écrit
 $\cos^2(\theta)$ pour
 $(\cos(\theta))^2$
 idem avec
 sinus
 idem avec des
 puissances
 naturelles

Le théorème de **Pythagore** appliqué dans le cercle trigonométrique implique l'importante relation $(\cos(\theta))^2 + (\sin(\theta))^2 = 1$. On l'écrira plus souvent sous la forme:

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

Angles remarquables

Voici quelques valeurs importantes des fonctions sinus et cosinus :

angle	sin	cos	tan	cot
0	$\sqrt{0}/2 = 0$	1	0	$\nexists$
$\pi/6$	$\sqrt{1}/2 = 1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}$
$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1	1
$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}/3$
$\pi/2$	$\sqrt{4}/2 = 1$	0	$\nexists$	0

(2.1)

Pour ces valeurs particulières: on obtient une des deux (cos ou sin) en lisant [sur le cercle trigonométrique](#), et l'autre [à partir de la relation fondamentale](#).

$$\rightarrow \sin(\pi/6) = \frac{1}{2} \quad \cos(\pi/6) = ? \quad \cos^2(\pi/6) + \sin^2(\pi/6) = 1$$

Et ensuite on calcule tan par

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

$$\begin{aligned} \cos^2(\pi/6) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 &= 1 \\ \cos^2(\pi/6) &= 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \\ \cos(\pi/6) &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

TP en ptit 2e commençant semaine 29/9

Contenu de la section

Fonctions trigonométriques

Définitions de sinus, cosinus, ...


Pente et angle

Relation fondamentale

Symétries

Fonctions périodiques

Cercle trigo




Principe

Nous allons voir dans les prochains slides comment obtenir de très nombreuses relations sur les fonctions $\sin$ et $\cos$ à partir du cercle trigonométrique.

Ces relations correspondent à des symétries de ces fonctions.

Symétrie par rapport à l'axe des abscisses



$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

$$\cos(-x) = \cos(x)$$


$$\tan(-x) = -\tan(x)$$

Si vous ne vous souvenez plus de ces relations, il faut savoir les retrouver en lisant le cercle trigonométrique. Ces formules montrent en particulier que sin et tan sont des fonctions impaires sur leur domaine de définition et cos est paire.

$$f(-x) = f(x)$$

$$f(-x) = -f(x)$$

Symétrie par rapport à l'axe des ordonnées



$$\sin(\pi - x) = \sin(x)$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos(x)$$


$$\tan(\pi - x) = -\tan(x)$$

Pour lire $\pi - x$: on trace d'abord $-x$, puis ajouter π revient à faire un demi-tour (dans le sens horaire). Et ensuite on lit la valeur des fonctions trigonométriques sur les axes.

Symétrie par rapport à l'origine

rotation de π rad.

Faire une symétrie par rapport à l'origine revient à faire un demi-tour, donc à rajouter π rad.



$$\sin(\pi + x) = -\sin(x)$$


$$\cos(\pi + x) = -\cos(x)$$

$$\tan(\pi + x) = \tan(x)$$

Vous devez savoir retrouver toutes ces relations à l'aide du cercle trigonométrique, en faisant un schéma comme ceux-ci (pensez à dessiner un angle "générique", qui ne soit pas proche de 90°).

Angles décalés de 90°

Décaler un angle de 90° degrés dans le sens positif revient à rajouter 90° donc $\frac{\pi}{2}$ rad.




$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cot(x)$$

Symétrie par rapport à la première bissectrice



$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot(x)$$

Contenu de la section

Fonctions trigonométriques

Définitions de sinus, cosinus, ...

Pente et angle

Relation fondamentale

Symétries

Fonctions périodiques

Fonctions périodiques

Définition

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $T > 0$ un nombre réel. On dit que f est périodique de période T si, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x+T) = f(x+T) = f(x) = f(x+\underline{2T})$$

On appelle période de f le plus petit nombre T vérifiant ça.

Fonctions périodiques

Exemple

- ▶ sin et cos sont 2π -périodiques. (Rajouter 2π c'est faire un tour complet de cercle trigonométrique).
- ▶ $\tan = \frac{\sin}{\cos}$ est alors aussi 2π -périodique. Mais: tan est en fait π -périodique, car:

$$\tan(\pi + x) = \frac{\sin(\pi + x)}{\cos(\pi + x)} = \frac{-\sin(x)}{-\cos(x)} = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \tan(x).$$

Handwritten note: "Symétrie" with an arrow pointing from the $\pi + x$ term to the x term in the sine and cosine functions.

La période de tan est donc π (le demi-tour).

Domaine de définition des fonctions sin, cos et tan


Les fonctions sin et cos sont définies **sur $\mathbb{R}$ entier**: elles sont définies sur $[0, 2\pi]$ grâce au cercle trigonométrique et sont 2π périodique, donc sont définies **sur $\mathbb{R}$ entier**.

La fonction $\tan(x)$ est définie comme $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$. Elle est donc définie uniquement lorsque $\cos(x) \neq 0$. Or, on voit sur le cercle trigonométrique que

$$\cos(x) = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ pour un certain } k \in \mathbb{Z}.$$

La fonction tan est donc définie sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Et comme elle est π -périodique elle est donc définie sur

$$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$



Contenu de la section

Formules de trigonométrie

Il existe des formules qui permettent d'exprimer les sinus et cosinus d'une somme d'angles en fonction des sinus et cosinus des angles de départ:

Résultat

Pour tous angles A et B

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$

Vous devez connaître ces formules qui seront exigibles à l'examen, et dont on se servira souvent en cours. (Attention aux signes qui changent entre $\cos(A + B)$ et $\sin(A + B)$).

Utilisation des formules de trigonométrie

Ces formules sont très utiles pour exprimer des expressions plus compliquées comme $\cos(3x)$, $\sin(5x)$, etc... **en fonction uniquement de $\cos(x)$ et $\sin(x)$.**

Exemple

- ▶ Pour tout angle x :

$$\sin(2x) = \sin(x + x) = \sin(x)\cos(x) + \cos(x)\sin(x) = 2\sin(x)\cos(x).$$

- ▶ Pour tout angle x : $\cos(2x) = \cos(x + x) = \cos(x)^2 - \sin(x)^2$

- ▶ Pour tout angle x :

$$\sin(3x) = \sin(2x + x) = \sin(2x)\cos(x) + \cos(2x)\sin(x)$$

$$\begin{aligned} &= 2\sin(x)\cos(x) + (\cos(x)^2 - \sin(x)^2)\sin(x) \\ &= 3\sin(x)\cos(x) - \sin(x)^3 \end{aligned}$$

En utilisant maintenant $\cos(x)^2 + \sin(x)^2 = 1$ il reste:

$$\sin(3x) = 3\sin(x)(1 - \sin(x)^2) - \sin(x)^3 = 3\sin(x) - 4\sin(x)^3.$$

On peut montrer de la même manière plein de formules différentes:

$$\cos A \cos B = \frac{\cos(A - B) + \cos(A + B)}{2}$$

$$\sin A \sin B = \frac{\cos(A - B) - \cos(A + B)}{2}$$

$$\sin A \cos B = \frac{\sin(A + B) + \sin(A - B)}{2}$$

$$\cos A \sin B = \frac{\sin(A + B) - \sin(A - B)}{2}$$

$$\cos p + \cos q = 2 \cos\left(\frac{p + q}{2}\right) \cos\left(\frac{p - q}{2}\right)$$

$$\sin p + \sin q = 2 \sin\left(\frac{p + q}{2}\right) \cos\left(\frac{p - q}{2}\right)$$

Pour l'examen, **seules les formules donnant $\sin(A + B)$, $\cos(A + B)$ et $\tan(A + B)$ seront exigées.** Il sera aussi demandé d'exprimer des nombres de la forme $\sin(7x)$, $\cos(3x)$, etc... en fonction de $\sin(x)$ et $\cos(x)$ comme ci-dessus.